

Use case 3 Weekend SEH opname

Scenario

- Dit scenario volgt direct op Use Case 2
- Patiënt XXX gebruikt 6 geneesmiddelen (deels huisarts) en is klinisch opgenomen, maar tijdens weekend verlof bij SEH terecht gekomen wegens bloed in de ontlasting.
- De situatie was:
 1. 2 medicatie ongemoeid gelaten.
 2. 2 medicaties overgezet op vergelijkbare middelen uit het ziekenhuis assortiment.
 3. 1 medicatie gewijzigd
 4. 1 medicatie gestaakt.
 5. 1 geheel nieuwe medicatie.
- De SEH wijzigt en voegt de volgende gegevens toe:
 1. Medicatie 3 en 5 worden gewijzigd.
 2. 1 geheel nieuwe medicatie toegevoegd.
- Arts / (ziekenhuis) apotheker verricht *opvragen MG* en overziet het resultaat.

De focus van de toetsing ligt op medicatieafspraken in het opvragen van medicatiegegevens. Het scenario mag ook gecombineerd worden met tussenliggende stappen in de workflow zoals het uitleveren van verstrekkingen of het registreren van medicatiegebruik. Dit is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare rollen in de POC.

Begin situatie (= eindsituatie Use Case 2)

Patiënt

999910814	A	van XXX_Schie	19540810	M	Knolweg 1000, 9999XA Enschede
-----------	---	---------------	----------	---	-------------------------------

Medicatieoverzicht

Actuele medicatie:

Geneesmiddel	Simvastatine accord table filmomhuld
Sterkte	40mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	chronisch
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Geneesmiddel	Ganfort oogdruppels flacon
Sterkte	3 ml
Dosering	1 x daags 1 Druppel
Duur	continu
Toedieningswijze	in beide ogen
Max dosering	

Geneesmiddel	Pantoprazol
Sterkte	20 mg
Dosering	1x daags 1 tablet

Duur	chronisch
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Geneesmiddel	Kalcipos d kauwtablet
Sterkte	500 mg
Dosering	1x daags 1 tablet 's avonds
Duur	continu
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Geneesmiddel	Azathioprine mylan tablet
Sterkte	50 mg
Dosering	1x daags 1 tablet 's 's morgens
Duur	30 dagen
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Geneesmiddel	Prednisolon cf
Sterkte	5 mg
Dosering	2 dagen 2 tabletten van 5 mg. 2 dagen 4 tabletten van 5 mg 3 dagen 6 tabletten van 5 mg
Duur	7 dagen
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Gestaakt:

Geneesmiddel	Omeprazol focus capsule msr
Sterkte	20 mg
Dosering	1x daags 1 capsule
Duur	Gestaakt; vervangen door Pantoprazol
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Geneesmiddel	Cortiment
Sterkte	50 mg
Dosering	1x daags 1 tablet 's 's morgens
Duur	gestaakt. Reden: opname ziekenhuis.
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Geneesmiddel	Calcichew tabletten
Sterkte	500 mg
Dosering	1x daags 1 tablet 's avonds
Duur	gestaakt, reden: opname ziekenhuis

Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Geneesmiddel	Pentasa tablet mva
Sterkte	1 g
Dosering	1x daags 4 tabletten
Duur	gestaakt
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Testscenario

De patiënt gaat tijdens weekendverlof naar huis en blijft de geneesmiddelen gebruiken, die hij van het ziekenhuis mee heeft gekregen. Thuis krijgt hij na de maaltijd darmkrampen en ziet bij de stoelgang veel bloed in de ontlasting. Patiënt gaat toch terug naar de SEH. De arts onderzoekt de patiënt en wijzigt het medicatiebeleid als volgt:

- De predisolon kuur wordt gewijzigd en verhevigd. De SEH arts geeft als reden “beleidswijziging” op. Patiënt gebruikt dan nu de 20 mg dosering volgens een doseerschema.
 - a. 2 dagen 2 tabletten van 20 mg.
 - b. 2 dagen 4 tabletten van 20 mg
 - c. 3 dagen 6 tabletten van 20 mg
- De Azathioprine mylan tabletten worden gestaakt en de patiënt gaat terug naar de Pentasa tablet 1g. 1x daags 4 tabletten. Als reden van stoppen van de Azathioprine geeft de SEH arts “(mogelijke) bijwerking” op.
- De arts schrijft als kalmeringsmiddel ook nog Oxazepam accord 10 mg voor 3x daags 1 tablet zo nodig.

Exit situatie

Kies zelf: SEH arts, ziekenhuis, datum & tijd bezoek aan de SEH

Actuele medicatie

Ongewijzigd:

Geneesmiddel	Simvastatine accord table filmomhuld
Sterkte	40mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	chronisch
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Geneesmiddel	Ganfort oogdruppels flacon
Sterkte	3 ml
Dosering	1 x daags 1 Druppel
Duur	continu
Toedieningswijze	in beide ogen
Max dosering	

Geneesmiddel	Pantoprazol
Sterkte	20 mg
Dosering	1x daags 1 tablet
Duur	chronisch
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Geneesmiddel	Kalcipos d kauwtablet
Sterkte	500 mg
Dosering	1x daags 1 tablet 's avonds
Duur	continu
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Geheractiveerd:

Geneesmiddel	Pentasa tablet mva
Sterkte	1 g
Dosering	1x daags 4 tabletten
Duur	2 weken
Toedieningswijze	
Max dosering	

Nieuw:

Geneesmiddel	Prednisolon PCH ZI 14619903 PREDNISOLON PCH TABLET 20MG HPK 1443364 PREDNISOLON PCH TABLET 20MG PRK 58173 PREDNISOLON TABLET 20MG GPK 111872 PREDNISOLON TABLET 20MG
Sterkte	20 mg
Dosering	2 dagen 2 tabletten van 20 mg. 2 dagen 4 tabletten van 20 mg 3 dagen 6 tabletten van 20 mg
Duur	
Toedieningswijze	
Max dosering	
Reden	Beleidswijziging
Vervangt	Prednisolon cf 5mg [N.B. met de huidige afspraken betekent medicatie met een andere sterkte automatisch een nieuwe MBH]

Geneesmiddel	Oxazepam accord tablet ZI 15732703 OXAZEPAM ACCORD TABLET 10MG HPK 1517287 OXAZEPAM ACCORD TABLET 10MG PRK 353 OXAZEPAM TABLET 10MG GPK 1023 OXAZEPAM TABLET 10MG
Sterkte	10 mg

Dosering	3x daags 1 tablet zonodig
Duur	10 dagen
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Gestaakte medicatie

Geneesmiddel	Azathioprine mylan tablet
Sterkte	50 mg
Dosering	1x daags 1 tablet 's 's morgens
Duur	30 dagen
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	
Reden	(mogelijke) bijwerking

Geneesmiddel	Prednisolon cf
Sterkte	5 mg
Dosering	Volgens opbouwschema
Duur	7 dagen
Toedieningswijze	oraal
Max dosering	

Toetsingscriteria

- Bij de Prednisolon kuur moet zichtbaar zijn dat de oorspronkelijke kuur van 5 mg gestaakt is en dat deze opgevolgd is door de kuur met opbouwschema van 20 mg.
- De reden van de wijziging van de Prednisolon kuur moet zichtbaar zijn.
- De opbouwschema van de Prednisolon kuur moet correct getoond worden.
- De reden van de wijziging van de Azathioprine moet zichtbaar zijn.