

## Use case Wijzigen dosering en sterkte geneesmiddel

### Start scenario: twee doseringen van hetzelfde geneesmiddel tegelijkertijd

- Een 64 jarige man met uitgezaaide prostaatkanker heeft meer pijn en zijn medicatie wordt gewijzigd. De huisarts schrijft oxycodon 10 mg tabletten voor 4d1t en zo nodig bij pijn 's nachts 1d1t. De huisarts legt dit in één medicatieafpraak met twee doseerinstructies vast en doet een verstrekkingverzoek voor 60 tabletten oxycodon 10 mg
- Vastgelegd wordt:
  - 1 nieuwe medicatieafpraak met 2 doseerinstructies
  - 1 verstrekkingverzoek voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts maakt de informatie (verstrekkingverzoek en medicatieafpraak) beschikbaar voor de medebehandelaars van deze patiënt.

### Situatie 1

#### Patiënt

|           |   |               |          |   |                               |
|-----------|---|---------------|----------|---|-------------------------------|
| 999910814 | A | van XXX_Schie | 19540810 | M | Knolweg 1000, 9999XA Enschede |
|-----------|---|---------------|----------|---|-------------------------------|

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

#### Medicatieafpraak

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Geneesmiddel     | OXYCODON TABLET MGA 10MG<br>ZI 15801586<br>HPK 2264749<br>PRK 57614<br>GPK 111430 |
| Sterkte          | 10 mg                                                                             |
| Dosering         | 4x daags 1 tablet en zo nodig bij pijn 's nachts 1x daags 1 tablet                |
| Startdatum       | T-5                                                                               |
| Toedieningswijze | oraal                                                                             |

#### Verstrekkingverzoek

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Te verstrekken hoeveelheid | 60 stuks |
|----------------------------|----------|

### Eind scenario: Hetzelfde geneesmiddel met verschillende sterkte tegelijkertijd

- Dezelfde 64 jarige patiënt krijgt toch weer meer pijn. De huisarts stopt de oxycodon 10mg tabletten en schrijft oxycodon 20 mg retard tabletten voor 3d2t en oxycodon 20 mg tabletten (normale afgifte) zo nodig bij pijn 's nachts 1d1t. De huisarts legt dit in twee medicatieafspraken (bij vooralsnog twee separate medicamenteuze behandelingen) vast en doet voor beide medicatieafspraken een verstrekingsverzoek, respectievelijk 45 retardtabletten oxycodon 20 mg en 30 tabletten oxycodon 20mg (normale afgifte).
- Vastgelegd wordt:
  - 1 staken medicatieafpraak
  - 2 nieuwe medicatieafspraken
  - 2 verstrekingsverzoeken voor de apotheker naar keuze
- Het systeem van de huisarts maakt de informatie (verstrekingsverzoek en medicatieafpraak) beschikbaar voor de medebehandelaars van deze patiënt.

### Situatie 2

#### Patiënt

|           |   |               |          |   |                               |
|-----------|---|---------------|----------|---|-------------------------------|
| 999910814 | A | van XXX_Schie | 19540810 | M | Knolweg 1000, 9999XA Enschede |
|-----------|---|---------------|----------|---|-------------------------------|

Kies zelf: huisarts, openbare apotheek

#### Staken Medicatieafpraak

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Geneesmiddel     | OXYCODON TABLET MGA 10MG                                           |
| Sterkte          | 10 mg                                                              |
| Dosering         | 4x daags 1 tablet en zo nodig bij pijn 's nachts 1x daags 1 tablet |
| Einddatum        | T                                                                  |
| Toedieningswijze | oraal                                                              |

#### Medicatieafpraak

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Geneesmiddel     | OXYCODON TABLET MGA 20MG<br>ZI 16026667<br>HPK 2429047<br>PRK 57622<br>GPK 111449 |
| Sterkte          | 20 mg                                                                             |
| Dosering         | 3x daags 2 tabletten                                                              |
| Startdatum       | T                                                                                 |
| Toedieningswijze | oraal                                                                             |

#### Verstrekingsverzoek

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Te verstrekken hoeveelheid | 45 stuks |
|----------------------------|----------|

#### Medicatieafpraak

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Geneesmiddel | OXYCODON TABLET MGA 20MG<br>ZI 15801594<br>HPK 2264757<br>PRK 57622<br>GPK 111449 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Sterkte          | 20 mg                                         |
| Dosering         | zo nodig bij pijn 's nachts 1x daags 1 tablet |
| Startdatum       | T                                             |
| Toedieningswijze | oraal                                         |

#### Verstrekkingsverzoek

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Te verstrekken<br>hoeveelheid | 30 stuks |
|-------------------------------|----------|

### Tijdstippen voor scenarios

Kies voor tijdstip T huidige datum.

### Toetsingscriteria

- We moeten de link kunnen zien tussen MA en bijhorende VV (zelfde MBH).
- We moeten de link kunnen zien tussen MA situatie 1 en staken-MA situatie 2
- We moeten kunnen zien dat MA situatie 1 en de twee MA's situatie 2 allemaal onder andere MBH's hangen.

Hoeveelheden en doseringen moeten kloppen. [Dit is geen primair doel van deze use case.]