

## Use case 4 Ontslagmedicatie

### Scenario

- Patiënt XXX gebruikt 7 middelen en is klinisch opgenomen geweest.
- Bij de opname werden de volgende maatregelen genomen:
  - 2 medicatie ongemoeid gelaten.
  - 2 medicaties overgezet op vergelijkbare middelen uit het ziekenhuis assortiment.
  - 1 medicatie gewijzigd
  - 1 medicatie gestaakt.
  - 1 geheel nieuwe medicatie.
- In de klinische periode werd:
  - 1 nieuwe medicatie toegevoegd. (Oxazepam)
  - 1 medicatie gewijzigd ( Prednisolon)
  - 1 medicatie veranderd ( Pentasa ipv Azathioprine).
- Bij ontslag wordt de volgende gegevens gewijzigd:
  1. 1 medicatie dat bij opname gestopt was wordt definitief gestaakt.
  2. 1 medicatie dat bij opname overgezet was op het huismerk van het ziekenhuis wordt weer teruggezet om het oorspronkelijke merk.
  3. 2 medicatie ongemoeid gelaten.
  4. 1 gewijzigde medicatie wordt verlengd
  5. 1 medicatie met huismerk ziekenhuis wordt verlengd.
  6. 1 medicatie met afbouwschema afgebouwd.
- Huisarts ( of apotheker) verricht *opvragen MG* en overziet het resultaat.

De focus van de toetsing ligt op medicatieafspraken in het opvragen van medicatiegegevens. Het scenario mag ook gecombineerd worden met tussenliggende stappen in de workflow zoals het uitleveren van verstrekkingen of het registreren van medicatiegebruik. Dit is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare rollen in de POC.

### Begin situatie

#### Patiënt

|           |   |               |          |   |                               |
|-----------|---|---------------|----------|---|-------------------------------|
| 999910814 | A | van XXX_Schie | 19540810 | M | Knolweg 1000, 9999XA Enschede |
|-----------|---|---------------|----------|---|-------------------------------|

### Medicatieoverzicht

#### Actuele medicatie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Geneesmiddel     | Simvastatine accord table filmomhuld |
| Sterkte          | 40mg                                 |
| Dosering         | 1x daags 1 tablet                    |
| Duur             | chronisch                            |
| Toedieningswijze | oraal                                |
| Max dosering     |                                      |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Geneesmiddel | Ganfort oogdruppels flacon |
| Sterkte      | 3 ml                       |
| Dosering     | 1 x daags 1 Druppel        |
| Duur         | continu                    |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Toedieningswijze | in beide ogen |
| Max dosering     |               |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Geneesmiddel     | Pantoprazol       |
| Sterkte          | 20 mg             |
| Dosering         | 1x daags 1 tablet |
| Duur             | chronisch         |
| Toedieningswijze | oraal             |
| Max dosering     |                   |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Geneesmiddel     | Kalcipos d kauwtablet       |
| Sterkte          | 500 mg                      |
| Dosering         | 1x daags 1 tablet 's avonds |
| Duur             | continu                     |
| Toedieningswijze | oraal                       |
| Max dosering     |                             |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Geneesmiddel     | Pentasa tablet mva   |
| Sterkte          | 1 g                  |
| Dosering         | 1x daags 4 tabletten |
| Duur             | 2 weken              |
| Toedieningswijze |                      |
| Max dosering     |                      |

|                  |  |
|------------------|--|
| Geneesmiddel     | Prednisolon PCH  |
| Sterkte          | 20 mg  |
| Dosering         | 2 dagen 2 tabletten van 20 mg.<br>2 dagen 4 tabletten van 20 mg<br>3 dagen 6 tabletten van 20 mg |
| Duur             |  |
| Toedieningswijze |  |
| Max dosering     |  |
| Reden            | Beleidswijziging   |
| Vervangt         | Prednisolon cf 5mg   |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Geneesmiddel     | Oxazepam accord tablet    |
| Sterkte          | 10 mg                     |
| Dosering         | 3x daags 1 tablet zonodig |
| Duur             | 10 dagen                  |
| Toedieningswijze | oraal                     |
| Max dosering     |                           |

#### Gestaakte medicatie

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Geneesmiddel | Azathioprine mylan tablet       |
| Sterkte      | 50 mg                           |
| Dosering     | 1x daags 1 tablet 's 's morgens |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Duur             | 30 dagen               |
| Toedieningswijze | oraal                  |
| Max dosering     |                        |
| Reden            | (mogelijke) bijwerking |

|                  |   |
|------------------|---|
| Geneesmiddel     | Prednisolon cf  |
| Sterkte          | 5 mg  |
| Dosering         | 2 dagen 2 tabletten van 5 mg.<br>2 dagen 4 tabletten van 5 mg<br>3 dagen 6 tabletten van 5 mg |
| Duur             | 7 dagen   |
| Toedieningswijze | oraal   |
| Max dosering     |   |

### Testscenario

De patiënt mag nu naar huis. Hij is voldoende gekalmeerd, maar moet nog wel voorzorgmaatregelen in acht nemen en de Prednisolon kuur toepassen:

- De Simvastatine en Ganfort oogdruppels blijven ongemoeid.
- De Cortiment dat tijdelijk gestaakt was, wordt definitief stopgezet.
- Voor de darmziekte krijgt de patiënt een nieuw voorschrift voor Pentasa.
- De Pantoprazol van het ziekenhuis wordt stopgezet en Omeprazol dat oorspronkelijk gebruikt werd, wordt voorgezet. De arts schrijft een nieuwe medicatieafpraak voor.
- De patiënt heeft nog voldoende kalmeringsmiddel en dus wordt de Oxazepam niet verlengd. Hij mag wel de voorraad opmaken.
- Voor de kalktabletten krijgt de patiënt een nieuw voorschrift van het ziekenhuismerk Kalcipos. [Eigenlijk zou hierdoor de onderbroken Calci Chew permanent gestopt moeten worden.]
- De patiënt krijgt wel een Prednisolon kuur 30 mg met een afbouwschema voor 90 dagen.
  - a. 20 dagen 6 tabletten van 30 mg
  - b. 20 dagen 5 tabletten van 30 mg
  - c. 20 dagen 4 tabletten van 30 mg
  - d. 10 dagen 3 tabletten van 30 mg
  - e. 10 dagen 2 tabletten van 30 mg
  - f. 10 dagen 1 tablet van 30 mg.

### Exit situatie

Gebruik voor de internist dezelfde arts als in use case 2. Kies zelf de ontslagdatum.

### Actuele medicatie

Onveranderd:

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Geneesmiddel     | Simvastatine accord table filmomhuld |
| Sterkte          | 40mg                                 |
| Dosering         | 1x daags 1 tablet                    |
| Duur             | chronisch                            |
| Toedieningswijze | oraal                                |
| Max dosering     |                                      |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Geneesmiddel     | Ganfort oogdruppels flacon |
| Sterkte          | 3 ml                       |
| Dosering         | 1 x daags 1 druppel        |
| Duur             | continu                    |
| Toedieningswijze | in beide ogen              |
| Max dosering     |                            |

Opnieuw (zelfde als van voor de opname):

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Geneesmiddel     | Omeprazol focus capsule msr |
| Sterkte          | 20 mg                       |
| Dosering         | 1x daags 1 tablet           |
| Duur             | chronisch                   |
| Toedieningswijze | oraal                       |
| Max dosering     |                             |

Gecontinueerd<sup>1</sup>:

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Geneesmiddel     | Kalcipos d kauwtablet       |
| Sterkte          | 500 mg                      |
| Dosering         | 1x daags 1 tablet 's avonds |
| Duur             | continu                     |
| Toedieningswijze | oraal                       |
| Max dosering     |                             |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Geneesmiddel     | Pentasa tablet mva   |
| Sterkte          | 1 g                  |
| Dosering         | 1x daags 4 tabletten |
| Duur             | 2 weken              |
| Toedieningswijze | oraal                |
| Max dosering     |                      |

Gewijzigd:

|                  |  |
|------------------|--|
| Geneesmiddel     | Prednisolon<br>ZI 15499774 PREDNISOLON MYLAN TABLET 30MG<br>HPK 2040964 PREDNISOLON MYLAN TABLET 30MG<br>PRK 66109 PREDNISOLON TABLET 30MG<br>GPK 115800 PREDNISOLON TABLET 30MG |
| Sterkte          | 30 mg  |
| Dosering         | Volgens afbouwschema   |
| Duur             | 90 dagen   |
| Toedieningswijze | oraal  |

<sup>1</sup> In de praktijk zal continueren van de klinische naar de poliklinische situatie over het algemeen leiden tot een (technische) stop van de klinische MA en een nieuwe MA voor de poliklinische situatie, maar dat is niet verplicht.

|              |  |
|--------------|--|
| Max dosering |  |
|--------------|--|

Voor de afbouwschema zie boven.

### Gestaakte medicatie

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Geneesmiddel     | Cortiment tablet  |
| Sterkte          | 9 mg              |
| Dosering         | 1x daags 1 tablet |
| Duur             | 30 dagen          |
| Toedieningswijze | oraal             |
| Max dosering     |                   |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Geneesmiddel     | Pantoprazol       |
| Sterkte          | 20 mg             |
| Dosering         | 1x daags 1 tablet |
| Duur             | chronisch         |
| Toedieningswijze | oraal             |
| Max dosering     |                   |

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Geneesmiddel     | Azathioprine mylan tablet       |
| Sterkte          | 50 mg                           |
| Dosering         | 1x daags 1 tablet 's 's morgens |
| Duur             | 30 dagen                        |
| Toedieningswijze | oraal                           |
| Max dosering     |                                 |
| Reden            | (mogelijke) bijwerking          |

|                  |   |
|------------------|---|
| Geneesmiddel     | Prednisolon cf  |
| Sterkte          | 5 mg  |
| Dosering         | 2 dagen 2 tabletten van 5 mg.<br>2 dagen 4 tabletten van 5 mg<br>3 dagen 6 tabletten van 5 mg |
| Duur             | 7 dagen   |
| Toedieningswijze | oraal   |
| Max dosering     |   |

|                  |  |
|------------------|--|
| Geneesmiddel     | Prednisolon PCH  |
| Sterkte          | 20 mg  |
| Dosering         | 2 dagen 2 tabletten van 20 mg.<br>2 dagen 4 tabletten van 20 mg<br>3 dagen 6 tabletten van 20 mg |
| Duur             |  |
| Toedieningswijze |  |
| Max dosering     |  |
| Reden            | Beleidswijziging   |
| Vervangt         | Prednisolon cf 5mg   |

## Toetsingcriteria

- De links tussen Azathioprine en Pentasa moet zichtbaar zijn.
- Bij de Prednisolon kuur moet zichtbaar zijn dat de oorspronkelijke kuur van 20 mg gestaakt is en dat deze opgevolgd is door de kuur met afbouwschema van 30 mg.
- De reden van de wijziging van de Prednisolon kuur moet zichtbaar zijn.
- De afbouwschema van de Prednisolon kuur moet correct getoond worden.
- Het moet zichtbaar zijn, dat de Omeprazol nu weer de gebruikte maagzuurremmer is i.p.v. Pantoprazol.